

Więzadło krzyżowe przednie i tylne prawidłowe.
Więzadło poboczne boczne i przyśrodkowe w normie.
Łąkotka boczna zmian nie wykazuje.
Łąkotka przyśrodkowa:
- cechy uszkodzenia typu FLAP w części odpiszczałowej, brzeznej trzony z wpuklaniem łąkotki do zachyłka łąkotkowo-piszczałowego na ok. 4 mm
- zmiany degeneracyjne śródłątkowe rogu tylnego, nierówne zarysy odpiszczałowej części RT z uwypuklaniem fragmentu łąkotki w kierunku piszczałowym - kontynuacja zmian o charakterze FLAP
- poza tym MM w normie

Niecharakterystyczne obrzęk szpiku w strefie podchrzęstnej L...
niskosygnałowym pionowym pasmem - do różnicowania skl...
zmianami obrzokowymi wtórnymi do chondropatii/ wczesne...
niewydolnościowe kłykcia (SIF). Do oceny w badaniu kontro...
Powierzchnia stawowa prawidłowej wysokości.

Poza tym struktura kostna kłykci kości udowej i piszczałowej p...
Ciało tłuszczowe Hoffv prawidłowe. Troczki rzenki zachowawce...

Fundraiser
goal
850 zł

Na hialuronowy strzał w kolano

I oto stało się w przeddzień moich 40 urodzin... W oceanie marzeń do spełnienia pojawiło się to jedno, wyjątkowe, które w istocie jest ze mną od 20 lat*. Zapisane jeszcze w zwojach DNA, projektujące moje wybory przeszłe i przyszłe. Marzenie o ruchu bezbolesnym, pełnym braku gonitwy myśli:...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/c9c8sv>

