

Więzadło krzyżowe przednie i tylne prawidłowe.  
Więzadło poboczne boczne i przyśrodkowe w normie.  
Łąkotka boczna zmian nie wykazuje.  
Łąkotka przyśrodkowa:  
- cechy uszkodzenia typu FLAP w części odpiszczałowej, brzeznej trzony z wpuklaniem łąkotki do zachyłka łąkotkowo-piszczałowego na ok. 4 mm  
- zmiany degeneracyjne śródłątkowe rogu tylnego, nierówne zarysy odpiszczałowej części RT z uwypuklaniem fragmentu łąkotki w kierunku piszczałowym - kontynuacja zmian o charakterze FLAP  
- poza tym MM w normie

Niecharakterystyczne obrzęk szpiku w strefie podchrzęstnej L...  
niskosygnałowym pionowym pasmem - do różnicowania skl...  
zmianami obrzokowymi wtórnymi do chondropatii/ wczesne...  
niewydolnościowe kłykcia (SIF). Do oceny w badaniu kontro...  
Powierzchnia stawowa prawidłowej wysokości.

Poza tym struktura kostna kłykci kości udowej i piszczałowej p...  
Ciało tłuszczowe Hoffv prawidłowe. Troczki rzenki zachowa...

Cel zrzutki  
850 zł

## Na hialuronowy strzał w kolano

I oto stało się w przeddzień moich 40 urodzin... W oceanie marzeń do spełnienia pojawiło się to jedno, wyjątkowe, które w istocie jest ze mną od 20 lat\*. Zapisane jeszcze w zwojach DNA, projektujące moje wybory przeszłe i przyszłe. Marzenie o ruchu bezbolesnym, pełnym braku gonitwy myśli:...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub  
wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/c9c8sv>

