

Diagnostyka obrazowa:

30-05-2022
Kręgosłup L-S bez kontrastu
SOR.

Na poziomie L4/L5 zwężenie tarczy m/k z obecnością wypukliny jądra miazdżystego do kanału kręgowego - do dokładnej oceny w MRI. Poza tym stwierdza się zniesienie lordozy lędźwiowej. Innych zmian w badaniu nie widać.
Opisał: Jarosław Jańczuk nr stat. 3051951

Badania laboratoryjne ATD:

29-05-2022

Morfologia z rozmazem automatycznym (5-diff)

Leukocyty=7,800[10³/ul][4 - 10] Erytrocyty=4,400[10⁶/ul][3,8 - 5,2]
Hemoglobina=13,900[g/dl][11,5 - 15,2] Hematokryt=41,500[%][35 - 46]
krwi=203,000[10³/ul][150 - 400] PCT=0,260[%][0,15 - 0,4] MPV=13,2[fL][9,0 - 12,5]
RDW-CV=11,900[%][11 - 17] RDW-SD=43,100[fL][37 - 49] MCHC=33,2[g/dl][32 - 36]
MCH=31,600[pg][27 - 32] MCV=94,400[fL][80 - 100] Neutrofile=55,000[%][40 - 70]
Neutrofile=5,500[10³/ul][1,6 - 7] Bazofile=0,300[%][0 - 2]
Eozynofile=0,700[%][0,5 - 7] Eozynofile=0,100[10³/ul][0,15 - 0,4]
Monocyty=5,500[%][4 - 12] Monocyty=0,400[10³/ul][0,2 - 0,8]
Limfocyty=1,800[10³/ul][1 - 3] PDW=16,000[%][11 - 22]
Jonogram
Sód=137,000[mmol/L][136 - 145] Potas=3,900[mmol/l][3,5 - 5,0]
INR
Czas protrombinowy=13,700[sek][11 - 15] INR=1,030[] [0,8 - 1,2]
protrombiny=97,100[%][80 - 120]
APTT
APTT Ratio=0,920[] [-] APTT=26,900[sek][24 - 35]

Fundraiser
goal
1 500 zł

Powrót do pełnej sprawności

Przez pewien czas dokuczał mi momentami ból przechodzący przez pośladek aż do łydki. Pojawiał się przy dłuższym chodzeniu, zbagatelizowałam to myśląc, że jest to spowodowane jakimś przeciążeniem. Z czasem ból przemieszczał się ku dołowi kończyny do palców stopy przy jednoczesnym mrowieniu. Pewnego...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/a43nse>

