

Badanie MR stawu kolanowego lewego

Nieco zwiększona ilość płynu w zachyłku nadržepkowym i okołorzepkowo- warstwa grubości do 6 mm bez cech przerostu błony maziowej.

Wskaźnik TT-TG 12 mm, wskaźnik I-S 1,25. Rzepka typu II/III wg Wiberga.

Rzepka nieco zlateralizowana - 3 mm, nieznacznie bocznie pochylona

Chrzątka stawowa:

-zmiany obrzękowo-degeneracyjne chrząstki rzepki, w części bocznej obszar chondropatii II-IV stopnia na szer. 7 mm, drobna torbiel podchrzęstna w trakcie formowania

- niskosygnałowe obszary w części bocznej chrząstki rzepki - blizny/ chrząstki włóknista.

- zmiany chondropatyczne II-III w przednio-dolnej części MFC

- chrząstka LTC o prawidłowej grubości, znacznie zmieniona degeneracyjnie, z pełnościennejmi pęknięciami

-poza tym chrząstka stawowa bez cech patologii, prawidłowej grubości o gładkiej powierzchni

Fałd przyśrodkowy błony maziowej bez cech konfliktowania z pokrywą chrząstki stawowych.

W tylnej części torebki stawowej dwa wolne (półwolne?) ciała chrzęstno-kościenne o wielkości 2-3 mm - pierwotna osteochondromatoza? Błona maziowa w części tylnej jamy stawowej nieznacznie pogrubiała.

Więzadło krzyżowe przednie i tylne prawidłowe.

Więzadło poboczne boczne i przyśrodkowe w normie.

Łąkotka boczna zmian nie wykazuje.

Łąkotka przyśrodkowa:

- cechy uszkodzenia typu FLAP w części odnieszczepkowej

Fundraiser
goal
850 zł

Na hialuronowy strzał w kolano

I oto stało się w przeddzień moich 40 urodzin... W oceanie marzeń do spełnienia pojawiło się to jedno, wyjątkowe, które w istocie jest ze mną od 20 lat*. Zapisane jeszcze w zwojach DNA, projektujące moje wybory przeszłe i przyszłe. Marzenie o ruchu bezbolesnym, pełnym braku gonitwy myśli:...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/c9c8sv>

