

Krwiak podtwardówkowy lewej półkuli mózgu.

Leczenie

Operacyjne: 02.04.2010r. - Kraniotomia skroniowo-czołowa lewostronna + ewakuacja krwiaka podtwardówkowego + ewakuacja krwiaka śródmózgowego lewego płata czołowego + resekcja naczyniaka tętniczo-żylnego czołowego.

Epikryza

Epikryza do pobytu na Oddziale **Neurochirurgii**

17-letnia dziewczyna przyjęta po badaniu TK głowy, w którym uwidoczniono śródmózgowy krwiak lewego płata czołowego. Z wywiadu w dniu przyjęcia nagły śmiertelny zawał serca z towarzyszącymi drgawkami. Przy przyjęciu zamroczona, oczy otwierała na bodźce słowne, słabsza reakcja zgięciowo-obronna, źrenice miernie szerokie, symetryczne, reagowały na światło, sztywność karku, objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Po rozmowie z rodzicami i lekarzami zdecydowano o operacji - ewakuowano krwiak śródmózgowy, resekowano naczyniak tętniczo-żylny lewego płata czołowego. Po zabiegu pacjentka przebudziła się, świadomość, wycofał się niedowład lewostronny. Stopniowo aktywizowana. Kontrola zmian pooperacyjnych. Rana sucha, zagojona przez rychłozrost. W stanie ogólnie dobrym, logicznym kontakcie słownym, bez niedowładów wypisana do domu pod opiekę rodziców.

leczenie rehablitacje

Cześć jestem Sylwia mam 29 lat jestem Mama pracuję potrzebuję wsparcia O to moja Historia Miałam 17 lat jak lekarze walczyli o moje życie w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu tętniczo-żylnego lewego płata czołowego. leżałam w śpiączce, okazało się po operacji że lewa strona ciała jest sparaliżowana,wybudziałam...

Scan the qr code with your phone camera or go to the following address

<https://zrzutka.pl/en/hrp42f>

