

Krwiak podtwardówkowy lewej półkuli mózgu.

Leczenie

Operacyjne: 02.04.2010r. - Kraniotomia skroniowo-czołowa lewostronna + ewakuacja krwiaka podtwardówkowego + ewakuacja krwiaka śródmózgowego lewego płata czołowego + resekcja naczyniaka tętniczko-żylnego czołowego.

Epikryza

Epikryza do pobytu na Oddziale **Neurochirurgii**

17-letnia dziewczyna przyjęta po badaniu TK głowy, w którym uwidoczniono śródmózgowy krwiak lewego płata czołowego. Z wywiadu w dniu przyjęcia nagły spadek świadomości z towarzyszącymi drgawkami. Przy przyjęciu zamroczona, oczy otwierała na bodźce pojedyncze słowa na bodźce bólowe, obronne ruchy celowane prawą kończyną. Słabsza reakcja zgięciowo-obronna, źrenice miernie szerokie, symetryczne, reagowały na światło. Sztywność karku, objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Po rozmowie z rodzicami i konsultacji z neurologiem operowana w trybie pilnym ze wskazań życiowych - ewakuowano krwiak śródmózgowy lewego płata czołowego. Po zabiegu powróciła do świadomości, wycofał się niedowład lewostronny. Stopniowo aktywizowana. Kontrola stanu ogólnego i funkcji życiowych. Rana sucha, zagojona przez rychłozrost. W stanie ogólnie zadowalającym logicznym kontakcie słownym, bez niedowładów wypisana do domu pod opiekę rodziców.

leczenie rehabilitacje

Cześć jestem Sylwia mam 29 lat jestem Mama pracuję potrzebuję wsparcia O to moja Historia Miałam 17 lat jak lekarze walczyli o moje życie w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu tętniczko-żylnego lewego płata czołowego. leżałam w śpiączce, okazało się po operacji że lewa strona ciała jest sparaliżowana,wybudziałam...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/hrp42f>

