

wykonano w sekwencjach PD FS trans sag cor, T1 cor, T2 trans, PD sat.

ania:

yp II/III według Wiberga z centralnie zlokalizowanym ubytkiem chrząstki powyż
widoczny nierówny, dolno-boczny brzeg rzepki z niewielkimi zmianami obrzęk
wego Hoffy - w przebiegu konfliktu rzepkowo-udowego.

rzepki, troczki rzepki bez ewidentnych zmian.
krzyżowe, poboczne bez ewidentnych zmian.
bez ewidentnych zmian urazowych.

bliższej części trzonu kości piszczelowej, w sąsiedzt
wałowe zagęszczenie grubości do 10 mm, o nieco nie
nacznym, może odpowiadać NOF w trakcie gojenia.

struktura kostna prawidłowa.

Cel zrzutki
3 000 zł

Rehabilitacja kolana

Cześć. Nazywam się Agata Przybylak. choruję na stwardnienie rozsiane: ↪ ↪ ↪ www.zrzutka.pl/sr8ug7 27 maja będę miała operację kolana. mam ponad 50% ubytku chrząstki, przestawioną rzepkę. Po operacji będę wymagała co najmniej 6 tygodniowej rehabilitacji. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna, nie stać mnie będzie...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/jsmtfk>

