

Niepowodzenia ART. (bez ins. I. IVF od 10.2019; 01.2020 KET [2] po PGS do 8 Hbd).

W leczeniu GynCentrum. 10 x w ciąży. Immunomodulacja: Badania genetyczne po poronieniu (uszkodzenia). Przy KET stosowano IL, Encorton 10 mg/d.

♀ 2020: allo-MLR 7,4%, cross-match ujemny, NK 40,1/49,1%, KIR Bx (bez defektu), ASA ujemne, ANA3 ujemne, LA obecny, aCL i aB2-GPI w normie, 2013-2014: ANA ujemne, APS wykluczony IP5, PC, AT, FVIII w normie, FVL nieobecny, aTPO/TG ujemne, NK 15,5% (02.2016), Wywiad rodzinny: ch. tarczycy u matki. Bez poronień/zakrzepicy.

♂ seminogram prawidłowy, 5% prawidłowych plemników, MAR Test ujemny, Kariotyp męża. Wywiad rodzinny: niecharakterystyczny.

KOMENTARZ:

Brak prawidłowej adaptacji immunologicznej do ciąży (nieodstateczny poziom allo-MLR).

W tej sytuacji istnieją wskazania do immunoterapii metodą szczepień ALPG - badania immunoglobulin i.v. (Privigen 20 g 3 dni przed FET, następnie w 3 i 7).

W razie decyzji o LIT niezbędne wykonanie badań kwalifikacyjnych

Badania diagnostyczne potrzebne do alloimmunizacji (szczepienia limfocytami p

Badanie dla kobiety:

przeciwciała p/cytomegalowirusowi (anty -CMV IgG, IgM).

Badanie dla mężczyzny (nie są potrzebne w przypadku LIT puławanych):

przeciwciała anty-HIV; anty-HCV; anty-HBs; antygen HBs; anty-CMV IgG, IgM; WR; Alat; a

Cel zrzutki
8 000 zł

Na bycie mamą

Od ponad 10 lat staramy się o dziecko byłam 10 razy w ciąży z tego ostatnia ciąża była z in vitro. W tej ostatniej ciąży pierwszy raz w życiu widziałam bijące serduszko gdyż w żadna poprzednia Nie doszła do tego etapu prawdopodobnie to było dzięki kroplowka z intralipidu jest to środek obniżający odporność nigdy...

Zeskanuj kod qr aparatem telefonu lub wejdź pod adres

<https://zrzutka.pl/v3eydz>

